

附件 3

国家谈判药品中纳入乙类管理的药品

序号	药品名称	限定支付范围
1	注射用艾普拉唑钠	消化性溃疡出血。
2	奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（I）	限活动性十二指肠溃疡或胃食管反流病。
3	奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（II）	限活动性良性胃溃疡。
4	富马酸伏诺拉生片	限反流性食管炎的患者。
5	替戈拉生片	限反流性食管炎。
6	甲磺酸多拉司琼注射液	
7	昂丹司琼口溶膜	
8	奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊	
9	甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者。
10	精氨酸谷氨酸注射液	限肝性脑病。
11	门冬氨酸鸟氨酸颗粒	治疗因急、慢性肝病如肝硬化、脂肪肝、肝炎所致的高血氨症，特别适合治疗早期的意识失调或神经系统并发症。
12	利那洛肽胶囊	限成人便秘型肠易激综合征（IBS-C）。
13	磷酸钠盐散	
14	德谷门冬双胰岛素注射液	限其他胰岛素或口服药难以控制的 2 型糖尿病患者。
15	德谷胰岛素利拉鲁肽注射液	限血糖控制不佳的成人 2 型糖尿病患者。
16	盐酸二甲双胍缓释片（III）	
17	二甲双胍恩格列净片（I）	本品配合饮食控制和运动，适用于正在接受恩格列净和盐酸二甲双胍治疗的 2 型糖尿病成人患者，用于改善这些患者的血糖控制。
18	阿卡波糖咀嚼片	
19	艾塞那肽注射液	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI≥25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
20	利拉鲁肽注射液	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI≥25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。

序号	药品名称	限定支付范围
21	利司那肽注射液	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI $\geq$ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
22	贝那鲁肽注射液	限 2 型糖尿病患者。
23	度拉糖肽注射液	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI $\geq$ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
24	聚乙二醇洛塞那肽注射液	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI $\geq$ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
25	司美格鲁肽注射液	本品适用于成人 2 型糖尿病患者的血糖控制：在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人 2 型糖尿病患者。适用于降低伴有心血管疾病的 2 型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件（心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中）风险。
26	艾托格列净片	限二线用药。
27	脯氨酸恒格列净片	限成人 2 型糖尿病患者。
28	西格列他钠片	
29	艾地骨化醇软胶囊	限绝经后女性骨质疏松症。
30	盐酸乙酰左卡尼汀片	限临床确诊的糖尿病周围神经病变患者。
31	铝镁匹林片（II）	
32	氯吡格雷阿司匹林片	
33	注射用重组人组织型纤溶酶原激活酶衍生物	限急性心肌梗死发病 12 小时内使用。
34	注射用重组人尿激酶原	限急性心肌梗死发病 12 小时内使用。
35	注射用阿替普酶	限急性心肌梗死发病 12 小时内、脑梗死发病 3 小时内的溶栓治疗，超过说明书规定用药时限的不予支付。
36	注射用重组人 TNK 组织型纤溶酶原激活剂	限急性心肌梗死发病 6 小时内使用。
37	甲苯磺酸艾多沙班片	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。
38	注射用甲磺酸萘莫司他	
39	注射用尖吻蝮蛇血凝酶	

序号	药品名称	限定支付范围
40	异麦芽糖酐铁注射液	限口服铁剂无效或无法口服补铁；或临床上需要快速补充铁。
41	罗沙司他胶囊	本品适用于慢性肾脏病（CKD）引起的贫血，包括透析及非透析患者。
42	达依泊汀 α 注射液	限接受血液透析的成人慢性肾脏病患者（CKD）的贫血。
43	多种油脂肪乳（C6~24）注射液	限经营养风险筛查，明确具有营养风险的肝功能不全（严重肝功能不全者除外）患者的二线用药。消化道有功能患者使用时不予支付。
44	复方氨基酸注射液（18AA-V-SF）	用于营养不良，低蛋白血症及外科手术前后。
45	复方氨基酸注射液（14AA-SF）	用于改善手术前后病人营养状态，亦用于蛋白质消化和吸收障碍，蛋白质摄入量不足或消耗过多等所致的轻度营养不良。
46	中长链脂肪乳/氨基酸（16）/葡萄糖（36%）注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
47	结构脂肪乳（20%）/氨基酸（16）/葡萄糖（13%）注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
48	小儿多种维生素注射液（13）	限与肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付。
49	艾考糊精腹膜透析液	
50	门冬氨酸钾镁木糖醇注射液	限洋地黄中毒引起的心律失常患者。
51	注射用重组人脑利钠肽	限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗，单次住院支付不超过3天。
52	丹参酮ⅡA磺酸钠注射液	
53	瑞加诺生注射液	
54	非奈利酮片	限2型糖尿病相关的慢性肾脏病成人患者。
55	注射用盐酸兰地洛尔	1. 手术过程中发生的下列快速性心律失常的紧急治疗：心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速；2. 手术后循环系统动态监护时发生的快速性心律失常的紧急治疗：心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速；3. 心功能不全患者发生下列快速性心律失常的治疗：心房纤颤、心房扑动。
56	盐酸艾司洛尔氯化钠注射液	
57	比索洛尔氨氯地平片	

序号	药品名称	限定支付范围
58	氨氯地平叶酸片（II）	用于治疗伴有血浆同型半胱氨酸水平升高的原发性高血压。氨氯地平降低血压，叶酸降低血同型半胱氨酸水平，升高血叶酸水平。
59	阿利沙坦酯片	用于轻、中度原发性高血压的治疗。
60	阿齐沙坦片	高血压。
61	美阿沙坦钾片	
62	沙库巴曲缬沙坦钠片	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg：用于射血分数降低的慢性心力衰竭（NYHA II-IV 级，LVEF≤40%）成人患者，降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）或血管紧张素 II 受体拮抗剂（ARB），与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg：用于治疗原发性高血压。
63	非诺贝酸片	
64	海博麦布片	本品作为饮食控制以外的辅助治疗，可单独或与 HMG-CoA 还原酶抑制剂（他汀类）联合用于治疗原发性（杂合子家族性或非家族性）高胆固醇血症，可降低总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、载脂蛋白 B（Apo B）水平。
65	依洛尤单抗注射液	1. 降低心血管事件的风险：在已有动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中，降低心肌梗死、卒中以及冠脉血运重建的风险。通过：与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药，伴随或不伴随其他降脂疗法，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药；2. 原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性高胆固醇血症）和混合型血脂异常：可作为饮食的辅助疗法，用于成人原发性高胆固醇血症（杂合子家族性和非家族性）或混合型血脂异常患者的治疗，以降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平：在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到 LDL-C 目标的患者中，与他汀类药物、或者与他汀类药物及其他降脂疗法联合用药，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药；3. 纯合子型家族性高胆固醇血症：用于成人或 12 岁以上青少年的纯合子型家族性高胆固醇血症。可与饮食疗法和其他降低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）治疗（例如他汀类药物、依折麦布、LDL 分离术）合用，用于患有纯合子型家族性高胆固醇血症（HoFH）且需要进一步降低 LDL-C 的患者。
66	阿利西尤单抗注射液	1. 心血管事件预防：在确诊为动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中，降低心肌梗死、卒中、需要住院的不稳定性心绞痛的风险。通过：与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药，伴随或不伴随其他降脂疗法，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药；2. 原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性和非家族性）和混合型血脂异常：可作为饮食的辅助疗法，用于成人原发性高胆固醇血症（杂合子型家族性和非家族性）或混合型血脂异常患者的治疗，以降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平。在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到 LDL-C 目标的患者中，与他汀类药物、或者与他汀类药物及其他降脂疗法联合用药，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药。

序号	药品名称	限定支付范围
67	本维莫德乳膏	限轻中度稳定性寻常型银屑病患者的一线治疗，需按说明书用药。
68	克立硼罗软膏	适用于2岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局部外用治疗。
69	克霉唑阴道膨胀栓	用于念珠菌性外阴阴道病。
70	注射用甲苯磺酸奥马环素	
71	苹果酸奈诺沙星胶囊	限二线用药。
72	苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液	为减少耐药菌的产生，保证奈诺沙星及其他抗菌药物的有效性，本品只用于治疗已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。在选择或修改抗菌药物治疗方案时，应考虑细菌培养和药敏试验的结果。如果没有这些试验的数据做参考，则应根据当地流行病学和病原菌敏感性进行经验性治疗。 在治疗前应进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对本品的敏感性。在获得以上检验结果之前可以先使用本品进行治疗，得到检验结果之后再选择适当的治疗方法。 在此类中的其他药物相同，使用本品进行治疗时，在治疗期间应定期进行细菌培养和药敏试验以掌握病原菌是否对抗菌药物持续敏感，并在细菌出现耐药性后能够及时发现。 本品可用于治疗对奈诺沙星呈现敏感的肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌以及肺炎支原体、肺炎衣原体和嗜肺军团菌所致的成人（≥18岁）社区获得性肺炎。 在使用本品时可依据患者病情严重程度及耐受性选用注射剂或口服制剂，也可选用治疗初期予以注射剂静脉输注，病情趋缓解后继以口服给药的序贯疗法。
73	注射用头孢唑林钠/氯化钠注射液	
74	注射用头孢美唑钠/氯化钠注射液	
75	注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液	
76	注射用头孢他啶/5%葡萄糖注射液	
77	注射用头孢他啶/氯化钠注射液	
78	小儿法罗培南钠颗粒	限头孢菌素耐药或重症感染儿童患者。
79	头孢托仑匹酯颗粒	限儿童患者。
80	盐酸头孢卡品酯颗粒	
81	吗啉硝唑氯化钠注射液	限二线用药。

序号	药品名称	限定支付范围
82	注射用磷酸左奥硝唑酯二钠	为减少耐药菌的产生，保证磷酸左奥硝唑酯二钠、左奥硝唑、奥硝唑及其他抗菌药物的有效性，磷酸左奥硝唑酯二钠只用于治疗或预防已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。在选择或修改抗菌药物治疗方案时，应考虑细菌培养和药敏试验结果。如果没有这些试验的数据做参考，则应当根据当地流行病学和病原菌敏感性进行经验性治疗。 在治疗前应进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对该抗菌药物的敏感性，在获得以上药敏结果之前可以先使用该抗菌药物进行治疗，得到药敏结果后再选择进行针对病原菌的治疗。 在治疗期间应定期进行细菌培养和药敏试验以掌握病原菌是否对抗菌药物持续敏感，并在细菌出现耐药性后能够及时发现。 本品仅适用于不宜口服给药的患者。 本品适应症为： 1. 本品适用于治疗肠道和肝脏严重的阿米巴病；2. 本品适用于治疗奥硝唑敏感厌氧菌引起的手术后感染；3. 本品适用于预防外科手术导致的敏感厌氧菌感染。
83	康替唑胺片	本品适用于治疗由对本品敏感的金黄色葡萄球菌（甲氧西林敏感和耐药的菌株）、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的复杂性皮肤和软组织感染。 为减少细菌耐药的发生，确保康替唑胺及其他抗菌药物的疗效，本品应仅用于治疗已确诊或高度怀疑由敏感菌引起的感染。本品不适用于治疗革兰阴性菌感染。如确诊或怀疑合并有革兰阴性菌感染，建议联合应用抗革兰阴性菌药物进行治疗。 在选择或调整抗菌药物治疗方案时，应考虑进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对本品的敏感性。如果没有这些试验的药敏数据做参考，则应根据当地细菌耐药性和抗菌药物敏感性等流行病学情况进行经验性治疗。在获得以上药敏结果之前可以先使用本品进行治疗，获得药敏结果后再选择进行针对性的病原治疗。
84	注射用两性霉素 B 胆固醇硫酸酯复合物	本品适用于患有深部真菌感染的患者；因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量的两性霉素 B 的患者，或已经接受过两性霉素 B 治疗无效的患者均可使用。
85	注射用硫酸艾沙康唑	限侵袭性曲霉病或侵袭性毛霉病的成人患者。
86	艾米替诺福韦片	本品适用于慢性乙型肝炎成人患者的治疗。
87	恩替卡韦口服溶液	恩替卡韦适用于病毒复制活跃，血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗（包括代偿及失代偿期肝病患者）。也适用于治疗 2 岁至 <18 岁慢性 HBV 感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者，有病毒复制活跃和血清 ALT 水平持续升高的证据或中度至重度炎症和/或纤维化的组织学证据。
88	恩替卡韦颗粒	限乙型肝炎。
89	阿兹夫定片	
90	重组细胞因子基因衍生蛋白注射液	限 HBeAg 阳性的慢性乙型肝炎患者。
91	盐酸阿比多尔颗粒	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。

序号	药品名称	限定支付范围
92	法维拉韦片（又称：法匹拉韦片）	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。
93	玛巴洛沙韦片	本品适用于 12 周岁及以上单纯性甲型和乙型流感患者，包括既往健康的患者以及存在流感并发症高风险的患者。
94	来特莫韦片	
95	来特莫韦注射液	
96	注射用紫杉醇脂质体	限：1. 卵巢癌的一线化疗及以后卵巢转移性癌的治疗、作为一线化疗，也可与顺铂联合应用；2. 用于曾用过含阿霉素标准化疗的乳腺癌患者的后续治疗或复发患者的治疗；3. 可与顺铂联合用于不能手术或放疗的非小细胞肺癌患者的一线化疗。
97	示踪用盐酸米托蒽醌注射液	限甲状腺手术区域淋巴结或乳腺癌前哨淋巴结的示踪。
98	醋酸戈舍瑞林缓释植入剂	
99	米诺膦酸片	
100	盐酸艾司氯胺酮注射液	限用于与镇静麻醉药联合诱导和实施全身麻醉。
101	环泊酚注射液	本品适用于：消化道内镜检查中的镇静；全身麻醉诱导。
102	利多卡因凝胶贴膏	限带状疱疹患者。
103	普瑞巴林缓释片	
104	吡仑帕奈片	
105	注射用利培酮微球（Ⅱ）	用于治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状和明显的阴性症状。可减轻与精神分裂症有关的情感症状。
106	棕榈帕利哌酮酯注射液（3M）	限接受过棕榈酸帕利哌酮注射液（1 个月剂型）至少 4 个月充分治疗的精神分裂症患者。
107	水合氯醛灌肠剂	限儿童。
108	注射用甲苯磺酸瑞马唑仑	限：1. 胃镜、结肠镜检查的镇静；2. 全身麻醉的诱导和维持。
109	注射用苯磺酸瑞马唑仑	限：1. 结肠镜检查；2. 全身麻醉诱导与维持。
110	水合氯醛/糖浆组合包装	儿童检查、操作前的镇静、催眠。
111	咪达唑仑口服溶液	用于儿童诊断或治疗性操作前以及操作过程中的镇静/抗焦虑/遗忘；也可用于儿童术前镇静/抗焦虑/遗忘。
112	咪达唑仑口颊粘膜溶液	
113	盐酸曲唑酮缓释片	

序号	药品名称	限定支付范围
114	甘露特钠胶囊	用于轻度至中度阿尔茨海默病，改善患者认知功能。
115	盐酸美金刚口溶膜	
116	注射用尤瑞克林	限新发的急性中度缺血性脑卒中患者，应在发作 48 小时内开始使用，支付不超过 21 天。
117	依达拉奉右莰醇注射液	限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作 48 小时内开始使用，支付不超过 14 天。
118	丁苯酞软胶囊	限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作 72 小时内开始使用，支付不超过 20 天。
119	丁苯酞氯化钠注射液	限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作 48 小时内开始使用，支付不超过 14 天。
120	苯环喹溴铵鼻喷雾剂	本品适用于改善变应性鼻炎引起的流涕、鼻塞、鼻痒和喷嚏症状。
121	乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂	限中重度慢性阻塞性肺病。
122	茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊（茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂）	限中重度慢性阻塞性肺病。
123	格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺疾病。
124	布地格福吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺疾病。
125	氟替美维吸入粉雾剂	限中重度慢性阻塞性肺病。
126	盐酸丙卡特罗粉雾剂	
127	倍氯福格吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺病。
128	茚达格莫吸入粉雾剂（II）	限未能充分控制的成年哮喘患者。
129	茚达特罗莫米松吸入粉雾剂（II）	
130	茚达特罗莫米松吸入粉雾剂（III）	
131	福多司坦口服溶液	
132	布林佐胺噻吗洛尔滴眼液	限二线用药。
133	布林佐胺溴莫尼定滴眼液	限二线用药。
134	环孢素滴眼液（II）	本品可促进干眼症患者的泪液分泌，适用于与角结膜干燥症相关的眼部炎症所导致的泪液生成减少的患者。

序号	药品名称	限定支付范围
135	复方电解质眼内冲洗液	
136	肠内营养乳剂（SP）	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且应为不能经饮食补充足够营养的住院患者方予支付。
137	环硅酸锆钠散	本品适用于治疗成人高钾血症。使用限制：因起效迟缓，本品不应该用于危及生命的高钾血症的紧急治疗。
138	重组结核杆菌融合蛋白（EC）	
139	吸入用氯醋甲胆碱	
140	注射用全氟丙烷人血白蛋白微球	用于常规超声心动图显影不够清晰者，增强显像效果，增加病变识别率及病变定性的准确性，增强左心室内膜边界的识别。
141	注射用全氟丁烷微球	本品仅用于诊断使用：注射用全氟丁烷微球是一种超声造影剂，用于肝脏局灶性病变血管相和 Kupffer 相的超声成像。
142	注射用福沙匹坦双葡甲胺	限放化疗且吞咽困难的患者。
143	硫酸镁钠钾口服用浓溶液	
144	复合磷酸氢钾注射液	
145	复方氨基酸（15AA-II）/葡萄糖（10%）电解质注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
146	碳酸氢钠林格注射液	
147	氨基酸（15）腹膜透析液	
148	托伐普坦片	
149	注射用多黏菌素 E 甲磺酸钠	
150	泊沙康唑肠溶片	限 13 岁和 13 岁以上重度免疫缺陷患者。
151	泊沙康唑注射液	限 18 岁和 18 岁以上重度免疫缺陷患者。
152	枸橼酸托法替布缓释片	
153	普瑞巴林口服溶液	
154	拉考沙胺注射液	
155	奥氮平口溶膜	
156	盐酸安非他酮缓释片（II）	

序号	药品名称	限定支付范围
157	舒更葡糖钠注射液	
158	地舒单抗注射液	限绝经后妇女的重度骨质疏松（60mg（1.0ml）/支（预充式注射器））
159	牛黄清感胶囊	
160	柴芩清宁胶囊	
161	疏清颗粒	
162	银翘清热片	
163	芪黄通秘软胶囊	益气养血，润肠通便。用于功能性便秘证属虚秘者。
164	清胃止痛微丸	
165	熊胆舒肝利胆胶囊	
166	冬凌草滴丸	限放疗后急性咽炎的轻症患者。
167	金银花口服液	
168	热炎宁合剂	
169	蓝芩口服液	
170	清肺排毒颗粒	
171	痰热清胶囊	
172	鸡骨草胶囊	
173	利胆止痛胶囊	
174	五味苦参肠溶胶囊	
175	小儿荆杏止咳颗粒	
176	连花清咳片	
177	金花清感颗粒	疏风宣肺，清热解毒。用于单纯型流行性感冒轻症，中医辨证属风热犯肺证者，症见发热，头痛，全身酸痛，咽痛，咳嗽，恶风或恶寒，鼻塞流涕，舌质红，舌苔薄黄，脉数。在新型冠状病毒肺炎的常规治疗中，可用于轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力。
178	化湿败毒颗粒	化湿解毒，宣肺泄热。用于湿毒侵肺所致的疫病，症见发热、咳嗽、乏力、胸闷、恶心、肌肉酸痛、咽干咽痛、食欲减退、口中粘腻不爽等。

序号	药品名称	限定支付范围
179	宣肺败毒颗粒	宣肺化湿，清热透邪，泻肺解毒。用于湿毒郁肺所致的疫病。症见发热，咳嗽，咽部不适，喘促气短，乏力，纳呆，大便不畅；舌质暗红，苔黄腻或黄燥，脉滑数或弦滑。
180	麻芩消咳颗粒	
181	射麻口服液	
182	小儿牛黄清心散	限高热神昏的急救、抢救时使用。
183	缓痛止泻软胶囊	
184	甘海胃康胶囊	
185	百令胶囊	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化。
186	参乌益肾片	限慢性肾衰竭患者。
187	芪黄颗粒	
188	桑枝总生物碱片	
189	通脉降糖胶囊	
190	参龙宁心胶囊	限冠心病和成年人恢复期病毒性心肌炎出现的轻度或中度室性过早搏动见上述证候者。
191	芪蛭益肾胶囊	
192	注射用益气复脉(冻干)	限二级及以上医疗机构冠心病心绞痛及冠心病所致左心功能不全 II-III 级的患者，单次住院最多支付 14 天。
193	益肾养心安神片	
194	八味芪龙颗粒	限中风病中经络（轻中度脑梗塞）恢复期患者。
195	杜蛭丸	限中风病中经络恢复期患者。
196	脑心安胶囊	限中重度脑梗塞、冠心病心绞痛患者。
197	芪丹通络颗粒	
198	芪芎通络胶囊	限中风病中经络（轻中度脑梗塞）恢复期患者。
199	心脉隆注射液	限二级及以上医疗机构慢性心力衰竭患者。
200	蒺藜皂苷胶囊	限中风病中经络（轻中度脑梗死）恢复期患者。
201	丹红注射液	活血化瘀，通脉舒络。用于瘀血闭阻所致的胸痹及中风，证见：胸痛，胸闷，心悸，口眼歪斜，言语蹇涩，肢体麻木，活动不利等症；冠心病、心绞痛、心肌梗塞，瘀血型肺心病，缺血性脑病、脑血栓。

序号	药品名称	限定支付范围
202	蛭蛇通络胶囊	益气活血，息风通络。用于中风病中经络（轻中度脑梗塞）恢复期气虚血瘀证。症见半身不遂，偏身麻木，口舌歪斜，舌强语蹇，自汗、气短乏力，脉沉细涩或弦。
203	西红花总苷片	限化疗产生心脏毒性引起的心绞痛患者。
204	注射用丹参多酚酸	限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者，单次住院最多支付 14 天。
205	注射用丹参多酚酸盐	限二级及以上医疗机构并有明确冠心病稳定型心绞痛诊断的患者。
206	血必净注射液	限二级及以上医疗机构重症患者的急救抢救。
207	银杏内酯注射液	限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者，单次住院最多支付 14 天。
208	银杏二萜内酯葡胺注射液	限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者，单次住院最多支付 14 天。
209	丹灯通脑软胶囊	
210	解郁除烦胶囊	
211	七蕊胃舒胶囊	
212	芍麻止痉颗粒	
213	川芎清脑颗粒	
214	降脂通络软胶囊	活血行气，降脂祛浊。用于高脂血症属血瘀气滞证者，症见胸胁胀痛、心前区刺痛、胸闷、舌尖边有瘀点或瘀斑、脉弦或涩。
215	复方黄黛片	限初治的急性早幼粒细胞白血病。
216	食道平散	限中晚期食道癌所致食道狭窄梗阻的患者。
217	康莱特注射液	限二级及以上医疗机构。
218	康艾注射液	限二级及以上医疗机构说明书标明恶性肿瘤的中晚期治疗。
219	参一胶囊	限原发性肺癌、肝癌化疗期间使用。
220	注射用黄芪多糖	限二级及以上医疗机构肿瘤患者，单次住院最多支付 14 天。
221	五虎口服液	
222	筋骨止痛凝胶	
223	玄七健骨片	
224	关黄母颗粒	补益肝肾，滋阴降火。用于女性更年期综合征（绝经前后诸证）中医辨证属肝肾阴虚证，症见烘热汗出，头晕，耳鸣，腰膝酸软或足跟痛，少寐多梦，急躁易怒等。

序号	药品名称	限定支付范围
225	坤心宁颗粒	
226	安儿宁颗粒	
227	红花如意丸	
228	如意珍宝片	