

附件 4

高值药品名单（共 18 个）（征求意见稿）

序号	药品名称	剂型	支付标准	限定支付范围
1	来那度胺	口服常释剂型		限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每 2 个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。
2	硼替佐米	注射剂		限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1. 每 2 个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。
3	利妥昔单抗	注射剂		限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤（国际工作分类 B、C 和 D 亚型的 B 细胞非霍奇金淋巴瘤），CD20 阳性 III-IV 期滤泡性非霍奇金淋巴瘤，CD20 阳性弥漫大 B 细胞性非霍奇金淋巴瘤；支付不超过 8 个疗程。
4	阿比特龙	口服常释剂型		限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌。
5	重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白	注射剂		限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。限成人重度斑块状银屑病。
6	戈利木单抗	注射剂		限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。
7	托珠单抗	注射剂		限全身型幼年特发性关节炎的二线治疗；限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者。
8	重组人凝血因子 VIII	注射剂		限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用
9	艾曲泊帕乙醇胺片		*	本品适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和 12 岁及以上儿童慢性免疫性（特发性）血小板减少症（ITP）患者，使血小板计数升高并减少或防止出血。本品仅用于因血小板减少和临床条件导致出血风险增加的 ITP 患者。

序号	药品名称	剂型	支付标准	限定支付范围
10	聚乙二醇化人粒细胞刺激因子(聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子)	注射剂		限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者
11	盐酸埃克替尼片		*	1. 本品单药适用于治疗表皮生长因子受体（EGFR）基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗。2. 本品单药可适用于治疗既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC），既往化疗主要是指以铂类为基础的联合化疗。3. 本品单药适用于 II-III A 期伴有表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变非小细胞肺癌（NSCLC）术后辅助治疗。4. 不推荐本品用于 EGFR 野生型非小细胞肺癌患者。
12	吉非替尼	口服常释剂型		限 EGFR 基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌
13	伊马替尼	口服常释剂型		限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。
14	达沙替尼	口服常释剂型		限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者
15	培美曲塞	注射剂		限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤
16	地西他滨	注射剂		限 IPSS 评分系统中中危-2 和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者
17	重组人凝血因子 IX	注射剂		限儿童乙（B）型血友病；成人乙（B）型血友病限出血时使用
18	重组人血小板生成素注射液		*	限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。

